

ROUNDUP FG

Roundup FG es un herbicida no selectivo para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en pre-siembra de cultivos con Labranza Convencional y con Siembra Directa.

MODO DE ACCIÓN.

Acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas.



RECOMENDACIONES DE USO DE ROUNDUP FG PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN BARBECHO QUÍMICO:

Cultivo	Nombre científico	Dosis (Kg/ha)
Barbecho químico	Rogelia (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	En campos en barbecho o medio barbecho, con baja infestación de malezas difíciles como <i>acalypha arvensis</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Ehirta</i> y <i>Commelina benghalensis</i> , en etapa vegetativa y no mayor a los 50 cm, aplicar 1,5 Kg/ha
	Bremura (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Pata de gallina (<i>Digitaria ciliaris</i>)	
	Plumilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)	
	Malcillo (<i>Sorghum sudanense</i>)	En campos de barbecho, con alta población de malezas difíciles como <i>Acalypha arvensis</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Ehirta</i> y <i>Commelina benghalensis</i> , en etapa vegetativa, aplicar la dosis 1,75 ó 2,0 kg/ha
	Malva taporita (<i>Sida rhombifolia</i>)	
	Gusanillo (<i>Acalypha arvensis</i>)	
	Leche-leche (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	
	Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	En campos con alta infestación de malezas difíciles como <i>Acalypha arvensis</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> , <i>Ehirta</i> y <i>Commelina benghalensis</i> , en etapa reproductiva, se recomienda el uso de la dosis 3,0 kg/ha
	Guapurucillo (<i>Solanum americanum</i>)	
	Chiori (<i>Amaranthus quitensis</i>)	
	Verdolaga camba (<i>Talinum paniculatum</i>)	
	Mamuri (<i>Senna obtusifolia</i>)	
	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	
SantaLucia (<i>Commelina benghalensis</i>)		