

Total Zina

Herbicida pre y post emergente para el control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha. Se debe aplicar al momento de la siembra o después, pero antes que germinen las malezas. Puede ser aplicado en cualquier tipo de suelo, excepto en cualquier en suelos arenosos y muy livianos.

MODO DE ACCION:
Sistémica y residual.



CULTIVO	MALEZAS		DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre Científico	
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Chiori Espinoso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Para caña de azúcar se recomienda aplicar TOTALZINA en su dosis de: 3.0 l/ha. Parcelas con predominancia de <i>Caperonia palustris</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Senna obtusifolia</i> y <i>Momordica charantia</i> , se recomienda aplicar TOTALZINA , en su dosis de: 3.5 l/ha. En campos de caña con historial de alta presión de <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Eclipta alba</i> y presencia mínima de <i>Ipomoea</i> spp., <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Momordica charantia</i> , <i>Talinum paniculatum</i> , <i>Commelina benghalensis</i> y <i>Digitaria ciliaris</i> , se recomienda aplicar TOTALZINA en su dosis de: 2.5 l/ha. En campos con historial de difícil control como <i>Ipomoea</i> spp., <i>Senna obtusifolia</i> , <i>Momordica charantia</i> , <i>Commelina benghalensis</i> y <i>Digitaria ciliaris</i> se recomienda aplicar TOTALZINA en su dosis de: 5.0 l/ha.
	Leche Leche	<i>Euphorbia heterophylla</i>	
	Golondrina	<i>Euphorbia hirta</i>	
	Macororo	<i>Ricinus communis</i>	
	Malva	<i>Caperonia palustris</i>	
	Quinchera	<i>Ipomoea</i> spp.	
	Camdillo	<i>Sida acuta</i>	
	Malva Taporita	<i>Momordica charantia</i>	
	Balsamina	<i>Eclipta alba</i>	
	Botoncillo	<i>Senna obtusifolia</i>	
	Mamuri	<i>Talinum paniculatum</i>	
	Verdelaga camba	<i>Commelina benghalensis</i>	
	Santa Lucia	<i>Rottboelia cochinchinensis</i>	
	Rogelia	<i>Digitaria ciliaris</i>	
	Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>	